



**Размещениями с повторениями** называют упорядоченную выборку, состоящую из  $n$  не обязательно различных элементов.

Пусть дано множество  $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ . Сколько кортежей длины  $k$  можно составить из  $n$  элементов этого множества?


Решение: Первый элемент каждого кортежа мы можем выбрать  $n$  способами, записав на первое место любой из  $n$  элементов. Второй элемент тоже можно выбрать  $n$  способами и т. д. Значит, общее число кортежей из множества  $n$  элементов, по  $k$  элементов в каждом, будет равно  $n^k$ . Число кортежей из  $n$  по  $k$  с учетом их порядка обозначается  $\overline{A_n^k}$ , и называют **числом размещений с повторениями из  $n$  элементов по  $k$** :  $\overline{A_n^k} = n^k$ .

В примере 1:  $\overline{A_4^3} = 4^3 = 64$ .

### Перестановки с повторениями.

**Пример 2.** Сколько четырехзначных чисел можно составить из 4 цифр: 1, 2, 3, 4?

**Решение:** Перечислим с помощью схемы все возможные числа:



Видим, что всего данных чисел  $4^4 = 256$ .

Данный пример является иллюстрацией к следующему понятию, которое является частным случаем, когда наше основное множество состоит из различных элементов:

Размещения с повторениями из  $n$  не обязательно различных элементов основного множества по  $n$  принято называть **перестановками с повторениями**. Число перестановок с повторениями обозначают  $\overline{P_n}$ .

Заметим,  $\overline{A_n^n} = \overline{P_n}$ . Общее число перестановок с повторениями из  $n$  элементов равно  $\overline{P_n} = n^n$ .

В примере 2:

**Пример 3.** Сколько семизначных чисел можно составить из 7 цифр: 1; 1; 2; 2; 2; 3; 4?


**Решение:** Заметим, что «1» повторяется 2 раза, «3» – три раза, а «3» и «4» – по одному. На этот случай существует другая формула перестановок с повторениями.

В общем случае, когда в нашем основном множестве какие-то элементы могут повторяться используют понятие:

### **Размещения без повторений (Размещения).**

**Пример 4.** Сколько трехзначных чисел, в которых цифры не повторяются, можно составить из 4 цифр: 1, 2, 3, 4?

**Решение:** Перечислим с помощью схемы все возможные числа:



Видим, что всего данных чисел  $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ .

Данный пример является иллюстрацией к следующему понятию:

Пусть множество  $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ . Сколько размещений без повторения элементов, по  $k$  элементов в каждом, можно составить из элементов этого множества?

**Решение:** На первое место можно записать любой элемент из  $M$ . Значит, имеем  $n$  возможностей. На второе место – любой элемент, кроме выбранного на первое место. Итак, при каждом выборе первого элемента для выбора второго имеем  $n-1$  возможностей, т. е. для выбора двух элементов имеем  $n(n-1)$  возможностей. При каждом выборе первых двух элементов для выбора третьего элемента имеем  $n-2$  возможностей и т. д. На последнее  $k$ -е место можно записать любой элемент, кроме выбранных  $k-1$  элементов на предыдущие места, т. е. для его выбора имеем  $n - (k-1) = n - k + 1$  возможностей. Следовательно, всего размещений из  $n$  по  $k$  элементов будет

$A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$ . Полученное выражение состоит из  $k$  последовательных натуральных множителей, наибольший из которых равен  $n$ . Умножив и разделив полученное выражение на  $(n-k)!$  получим:

$$n(n-1)\dots(n-k+1) =$$

$$\frac{n(n-1)\dots(n-k+1)(n-k)(n-k-1)\dots3(2(1))}{(n-k)(n-k-1)\dots3(2(1))} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

**Размещениями** называют упорядоченную выборку  $k$  элементов, из  $n$  различных элементов основного множества.

Число всех выборов  $k$  элементов из  $n$  различных элементов данного множества с

$$A_n^k$$

учетом их порядка обозначают **элементами по  $k$** .


и называют **числом размещений из  $n$**

В примере 4:  $A_4^3 = \frac{4!}{(4-3)!} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24.$

**Перестановки без повторений (Перестановки).**

**Пример 5.** Сколько четырехзначных чисел, в которых цифры не повторяются, можно составить из 4 цифр: 1, 2, 3, 4?

**Решение:** Перечислим с помощью схемы все возможные числа:



Видим, что всего данных чисел  $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$

Данный пример является иллюстрацией к следующему понятию:

Размещения из  $n$  элементов по  $n$  принято называть перестановками. Иначе, **перестановки** — это упорядоченные множества из  $n$  различных элементов основного множества по  $n$ . Перестановки отличаются друг от друга только порядком элементов. Число перестановок принято обозначать  $P_n$ . Общее число перестановок из  $n$  элементов равно  $P_n = n!$


В примере 5:  $P_4 = 4! = 4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = 24.$

**Неупорядоченные выборки. (Одновременный выбор)**

**Сочетания без повторений. (Сочетания).**

**Пример 6.** Сколько трехэлементных подмножеств, различающихся хотя бы одним элементом друг от друга и без учета порядка в подмножестве, можно составить из 4 цифр: 1, 2, 3, 4?

**Решение:** Перечислим все полученные подмножества:



Данный пример является иллюстрацией к следующему понятию:

**Сочетания.** Сочетаниями из  $n$  элементов по  $k$  называются соединения, каждое из которых содержит  $k$  элементов из данного множества  $n$  элементов и отличается от других хотя бы одним элементом. В сочетаниях нас интересуют только сами элементы множества и не интересует их порядок. Важно, какие конкретно элементы множества входят в каждое соединение.

Число сочетаний, т. е. число всех различных подмножеств длины  $k$  из данного множества, содержащего  $n$  элементов, обозначается  $C_n^k$ . Легко видеть, что если мы возьмем все сочетания из  $n$  по  $k$  и в каждом из них упорядочим элементы всеми возможными способами, т. е. из каждого сочетания получим все возможные перестановки, то получим все размещения из  $n$  элементов по  $k$ . Значит,

$$A_n^k = C_n^k \cdot P_k. \quad \text{Отсюда}$$

или

$$C_n^k = \frac{P_n}{P_k \cdot P_{n-k}}$$

Иначе

В примере 6:

**Пример 7.** Сколькими способами можно выбрать  $k$  предметов из  $n$ ? Например:

а) одновременно вынимают две карты из колоды:

б) наугад зачеркивают 6 чисел из 49-ти:

в) случайно отбирают трех человек из 25:

$$C_{25}^3 = \frac{25!}{22! \cdot 3!} = 2\,300.$$

**Сочетания с повторениями.**

**Сочетания с повторениями** – неупорядоченная выборка, состоящая из  $n$  не обязательно различных элементов. Обозначается  $\overline{C}_n^k$ .

$$\overline{C}_n^k = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}.$$

где  $n$  – количество не обязательно различных элементов основного множества,  $k$  – количество выбираемых.

**Пример 8.** Сколько будет костей в игре домино, если использовать, только четыре цифры 1, 2, 3, 4?

**Решение:** Используем формулу сочетаний с повторениями:

$$\overline{C}_4^2 = \frac{(4+2-1)!}{2!(4-1)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!2} = 10.$$

**Ответ** 10.

### Задачи для тренировки

**Пример 9.** Сколько четырехзначных чисел можно составить из 9 цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?

**Решение:** Цифры в числах могут повторяться, и число зависит от порядка цифр в его записи. Значит, это размещения с повторениями, т. е. кортежи. Их число  $\overline{A}_9^4 = 9^4 = 6561$ .

**Ответ** 6561.

**Пример 10.** В чемпионате участвует 12 команд. Сколькими различными способами могут быть распределены три различные медали?

**Решение:** Это размещения без повторения, т.к. одна команда не может занять два или три места сразу.  $A_{12}^3 = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320$ .

**Ответ** 1320.

**Пример 11.** В семье 6 человек. За столом 6 стульев. В семье решили каждый вечер рассаживаться на эти 6 стульев по-новому. Сколько дней члены семьи смогут делать это без повторений?

**Решение.** Одного человека мы можем посадить только один раз. Значит, имеем перестановки без повторений. Одно размещение от другого может отличаться только порядком размещения людей, т. е. имеем перестановки 6 элементов:  $P_6 = 6! = 720$ .

**Ответ** 720.

**Пример 12.** Сколькими способами из класса, в котором учатся 30 школьников, можно выбрать капитана команды для математических соревнований и его заместителя?

**Решение:** 1-й способ:

На роль капитана может быть выбран любой из 30 учащихся, а его заместитель – любой из 29 оставшихся учеников. Таким образом, получаем  $30 \cdot 29 = 870$  способов.

2-й способ: Порядок важен, тогда по формуле числа размещений имеем

$$A_{30}^2 = \frac{30!}{(30-2)!} = \frac{30!}{28!} = \frac{30 \cdot 29 \cdot 28!}{28!} = 30 \cdot 29 = 870$$

способов.

**Ответ** 870.

**Пример 13.** Сколькими способами из класса, в котором учатся 30 школьников, можно выбрать двоих для участия в математической олимпиаде?

**Решение:** 1-й способ:

Нам не важно, кто капитан, а кто заместитель, нам нужны всего лишь два участника, поэтому получаем, что у нас каждая пара учащихся в произведении повторяется два раза. Поэтому ответом для второй задачи будет  $(30 \cdot 29) : 2 = 435$ .

2-й способ: Без учета порядка применим формулу числа сочетаний

$$C_{30}^2 = \frac{30!}{(30-2)! 2!} = \frac{30!}{28! 2!} = \frac{30 \cdot 29 \cdot 28!}{28! \cdot 2} = \frac{30 \cdot 29}{2} = 435$$

**Ответ** 435.

**Пример 14.** Сколько трехкнопочных комбинаций существует на кодовом замке (все три кнопки нажимаются одновременно), если на нем всего 10 цифр?

**Решение:** Так как кнопки нажимаются одновременно, то выбор этих кнопок – сочетание. Отсюда возможно

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)! 3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$$

вариантов.

**Ответ** 120.

**Пример 15.** Три медведя выбегают из дома, догоняя девочку. Сколькими способами они смогут это сделать?

**Решение:** Порядок выбегания из дома задает нумерацию трех медведей числами 1 2 3. Таких нумераций  $3! = 6$ .

**Ответ** 6.

**Пример 16.** Сколькими способами можно построить пятерых человек в шеренгу?

**Решение:** По формуле числа перестановок имеем  $P_5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ .

**Ответ** 120.

**Пример 17.** Сколькими способами 4 вора могут по одному разбежаться на все 4 стороны?

**Решение:** Стороны фиксированы, например юг, север, запад, восток или для простоты 1 2 3 4. Порядок разбегания по ним задает нумерацию 4-х воров числами 1 2 3 4. Таких нумераций имеется  $4! = 24$ .

**Ответ** 24.

**Пример 18.** 11 футболистов строятся перед началом матча. 1-ым – обязательно капитан, 2-ым – обязательно вратарь, а остальные – случайным образом. Сколько существует способов построения?

**Решение:** Капитана и вратаря строить не надо, т.к. их места фиксированы. 9 футболистов (все, кроме капитана и вратаря) надо расставить на 9 мест – с 3-его по 11-е. Всего имеется  $9! = 362\,880$  таких перестановок.

**Ответ** 362 880.

**Пример 19.** В классе 27 учеников, из которых нужно выбрать троих. Сколькими способами это можно сделать, если: а) 1-й ученик должен решить задачу, 2-й – сходить за мелом, 3-й – пойти дежурить в столовую; б) им следует спеть хором?

**Решение:** а) Порядок важен:


б) Порядок неважен:

**Ответ** а) 17 550, б) 2 925.

**Пример 20.** В коридоре 3 лампочки. Сколько существует различных способов освещения коридора? (включая случай, когда все три не горят)

**Решение:** 1-й способ: Пронумеруем лампочки. 1-я: горит или не горит (2 исхода), 2-я: горит или не горит (2 исхода), 3-я: горит или не горит (2 исхода). Лампочки горят или нет независимо друг от друга. По правилу умножения:  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ .

2-й способ: Приведем дерево вариантов данной задачи:



Например, (+ - +) означает, что горят 1-я и 3-я, (---) – не горит ни одна и т.д. в нашем случае у трехэлементного множества  $2^3 = 8$  подмножеств.

**Пример 21.** У бармена есть 6 сортов зеленого чая. Для проведения чайной церемонии требуется подать зеленый чай ровно 3 различных сортов. Сколькими способами бармен может выполнить заказ?

**Решение:** Тут все просто: есть  $n = 6$  сортов, из которых надо выбрать  $k = 3$  сорта. Число сочетаний можно найти по формуле:

$$C_6^3 = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \dots = 20$$

**Ответ** 20.

**Пример 22.** В чемпионате по футболу 7 команд. Каждая команда играла с каждой один раз. Сколько всего было игр?

**Решение:** Порядок выбора не имеет значения, т.е. если выбраны две команды, то неважно, какая из них первая, а какая – вторая:

**Ответ 21.**

**Пример 23.** Сколько всего исходов, если друг за другом из колоды вынимают две карты, не возвращая карту обратно (выбор без возвращения)?

$$A_{36}^2 = \frac{36!}{(36-2)!} = \frac{36!}{34!} = \frac{36 \cdot 35 \cdot 34!}{34!} = 36 \cdot 35 = 1260.$$

**Решение:**

**Ответ 1260.**

**Пример 24.** Сколько существует всего исходов, если из колоды вынимают две карты одновременно?

**Решение:** Порядок не важен, значит:

**Ответ 630.**